



Gewassen waarin BlueN toegepast kan worden

Gewas groep	Dosering	Gewasstadium	Kan bijv. in tankmix gespoten worden met
Aardappelen	333 g/ha	Vanaf 4-blad stadium	1e Phytophthora bestrijding
Aromatische kruiden			Onkruidbestrijding voorjaar of T0/T1 ziektebestrijding
Bladgroenten			
Bieten			
Graan			
Grasland		Vanaf T-som 350 graden	Onkruidbestrijding
Graszaadteelt			
Groot fruit		Eerste echte bladeren volledig ontvouwd	T1 ziektebestrijding
Klein fruit			
Koolgewassen		Vanaf 4-blad stadium	Onkruidbestrijding
Mais			
Noten		Eerste echte bladeren volledig ontvouwd	
Oliehoudende zaden		Vanaf 4-blad stadium	Onkruidbestrijding
Overige akkerbouwgewassen (bijvoorbeeld Cichorei, Witlof of Boekweit)			
Peulvruchten		Vanaf 3-blad stadium	Onkruidbestrijding
Sierteelt gewassen (bijvoorbeeld Bloembollen en -knollen, bloemzaad of Boomkwekerijgewassen)		Eerste echte bladeren volledig ontvouwd	Apart spuiten
Stengelgroenten (bijvoorbeeld Asperge, Bleekselderij of Prei)		Vanaf 4-blad stadium	Onkruidbestrijding
Ui-achtigen		Vanaf 4-pijp stadium	Ziektebestrijding
Vruchtgroenten		Vanaf 4-blad stadium	
Wortel- en knolgewassen			Onkruidbestrijding



www.bluen.nl